



PEDIATRIC EATING ASSESSMENT TOOL (PediEAT)

Intended Use: The PediEAT is intended to assess observable symptoms of problematic feeding in children between the ages of 6 months and 7 years who are being offered some solid foods. The PediEAT is intended to be completed by a caregiver who is familiar with the child's typical eating. This is most often a parent, but may be another primary care provider.

Disclosure: The PediEAT does not replace a healthcare provider's clinical assessment. The PediEAT is also not intended to provide a diagnosis, but instead may provide the health care provider with an objective assessment of the child's eating in order to facilitate diagnosis and treatment decisions.

Terms of Use: You may use the PediEAT for clinical practice or research, but you may not alter, distribute, share, or adapt the PediEAT for electronic medical charting or other digital use without permission from the authors. The PediEAT is protected by U.S. copyright law. Full terms of use below.

Referencing Information: Please give appropriate credit to the authors when presenting, publishing, or otherwise referencing the Pediatric Eating Assessment Tool (PediEAT).

Thoyre, S., Pados, B., Park, J., Estrem, H., Hodges, E., McComish, C., Van Riper, M., and Murdoch, K. (2014). Development and content validation of the Pediatric Eating Assessment Tool (Pedi-EAT). *American Journal of Speech-Language Pathology*, 23, 1-14. doi: 10.1044/1058-0360(2013/12-0069)

Thoyre, S., Pados, B., Park, J., Estrem, H., McComish, C., Hodges, E. (2018). The Pediatric Eating Assessment Tool: Factor structure and psychometric properties. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 66(2), 299-305. doi: 10.1097/MPG.0000000000001765

Pados, B.F., Thoyre, S.M., & Park, J. (2018). Age-based norm-reference values for the Pediatric Eating Assessment Tool. *Pediatric Research*, 84(2), 233-239. doi:10.1038/s41390-018-0067-z

Note: The PediEAT and the PediEAT 10-item Screeners are not in any way associated with the PEDI-EAT-10 by Soyer et al., 2017 or Arsian et al., 2018.

PLEASE CHECK THE FEEDING FLOCK TEAM WEBSITE FOR UPDATES:

www.feedingflockteam.org

Terms of Use of Assessment Tools

The assessment tools developed by the authors are available for your non-commercial use in clinical practice, education, and research. You must agree to the following terms to download the assessment tools.

These assessment tools are protected by copyright. Your right to use of the assessment tools is limited to the right to use the tools for your personal, non-commercial use in accordance with the terms and conditions below.

- I acknowledge and agree that I may not reproduce, publish, share, distribute, or sell any of the assessment tools to anyone without prior written approval from an author and an appropriate license agreement executed by the author(s) of the tools.
- I agree that I will reference the tools by their correct names and credit the specific authors of the tools in my own presentations, publications, or any other work that I may generate using the tools. Reference information is available on the front page of each assessment tool.
- I acknowledge and agree that I may not alter the assessment tools in any way or create any derivative work from any of the assessment tools, including translating the tools into other languages, without the prior written approval from an author.
- I agree to use the assessment tools solely as intended (as set forth on the front page of each assessment tool).
- I acknowledge and agree that these assessment tools are not intended to be or to be considered or used as medical advice and/or diagnostic tools and do not replace a healthcare provider's assessment or care.
- I agree that the assessment tools are being provided "as is" and that neither the authors of the tools or their institutional affiliations make any warranty with respect to the tools.
- I acknowledge and agree that neither the authors of the tools, their institutional affiliations, or business affiliations shall have any liability with respect to the tools or the use of the tools, including without limitation ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL, OR OTHER DAMAGES.
- I hereby waive and agree to release the authors of the tools, their institutional affiliations, and business affiliations from and against all claims, liabilities, and damages of any kind arising out of my use of the tools.

Instrumentul de Evaluare pentru Alimentație Pediatrică (PediEAT)

Scopul utilizării: Chestionarul PediEAT este destinat pentru a fi folosit în evaluarea simptomelor de alimentare problematică la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 7 ani, cărora le sunt oferite unele alimente solide. Chestionarul PediEAT este conceput pentru a fi completat de un îngrijitor care este familiarizat cu obiceiurile tipice de alimentare ale copilului. Acesta este de cele mai multe ori un părinte, dar poate fi și un alt furnizor de îngrijire primară.

Divulgare: Instrumentul de screening PediEAT nu înlocuiește evaluarea clinică a unui furnizor de servicii medicale. De asemenea, PediEAT nu este destinat să ofere un diagnostic, ci poate oferi furnizorului de servicii medicale o evaluare obiectivă a modului de alimentare a copilului pentru a facilita deciziile de diagnostic și tratament.

Referințe:

Thoyre, S., Pados, B., Park, J., Estrem, H., Hodges, E., McComish, C., Van Riper, M., and Murdoch, K. (2014). Development and content validation of the Pediatric Eating Assessment Tool (Pedi-EAT). *American Journal of Speech-Language Pathology*, 23, 1-14. doi: 10.1044/1058-0360(2013/12-0069)

Thoyre, S., Pados, B., Park, J., Estrem, H., McComish, C., Hodges, E. (2018). The Pediatric Eating Assessment Tool: Factor structure and psychometric properties. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 66(2), 299-305. doi: 10.1097/MPG.0000000000001765 PMID: 28953526

Pados, B.F., Thoyre, S.M., & Park, J. (2018). Age-based norm-reference values for the Pediatric Eating Assessment Tool. *Pediatric Research*, 84(2), 233-239. doi: 10.1038/s41390-018-0067-z

Pentru actualizări ale referințelor vă rugăm să contactați prin email autorul chestionarului original.

Termeni și condiții de utilizare:

Reproducerea conținutului acestui chestionar, integral sau parțial, în forma originală sau modificată, precum și stocarea în format electronic și transmiterea sub orice formă și prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a autorului/autorilor chestionarelor originale, membru/membri ai echipei de cercetare Feeding Flock. Utilizarea conținutului acestui chestionar în articole, studii, cărți sau orice alt material publicistic este posibilă exclusiv cu autorizarea și/sau acordul expres al autorului/autorilor și numai cu indicarea precisă a sursei.

Acest chestionar a fost tradus și adaptat în limba română din limba engleză de Andra Pîrvan, Dr. Bogdan Fițiu, Asist. Monica Feroli, Dr. Mihaela Ștefănescu, Constanța Zurini-Muică, Dr. Andreea Manda (www.andreea.manda@eat-telecare.ro)

Varianta în limba română a acestui chestionar a fost realizată cu permisiunea documentată a autorului/autorilor variantei originale, membru/membri ai echipei de cercetare Feeding Flock. Orice traducere și/sau adaptare viitoare este posibilă numai cu acordul scris al autorului/autorilor chestionarului original.

Notă: PediEAT nu este în nici un fel asociat cu PEDI-EAT-10 realizat de Soyer și colegii (2017).

Copilul meu...	Niciodată	Aproape Niciodată	Uneori	Adesea	Aproape întotdeauna	Întotdeauna	Scor
11. are nevoie să ia pauză în timpul mesei pentru a se odihni sau a-și trage răsuflarea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. obosește mâncând și nu este capabil să termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. transpiră/devine rece în timpul meselor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. își înclină capul pe spate în timp ce mănâncă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. râgâie mai mult decât de obicei în timp ce mănâncă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. vomită în timpul mesei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17. vomită între mese (de la 30 de minute de la ultima masă și până la următoarea masă)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. își arcuiește spatele în timp ce sau după ce mănâncă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19. are gag atunci când e timpul să mănânce (de ex. când vede mâncare sau este plasat în scaunul de masă)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20. are gag la mâncare moale cum ar fi cremă, mousse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21. are gag la mâncare texturată cum ar fi terciul de ovăz integral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22. are gag, tușește sau vomită când se spală pe dinți (dacă, copilul dvs nu are dinți selectați Niciodată. Dacă, copilul dvs nu va permite să îl spălați pe dinți, selectați Întotdeauna)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23. i se umflă burtica după ce mănâncă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24. se înroșește la față, plânge când are scaun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25. are gaze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26. îi curge saliva din gură când mănâncă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27. mănâncă cu dificultate din cauza nasului înfundat, plin de secreții	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scorul Subscalei Simptome Fiziologice							

Copilul meu...	0	1	2	3	4	5	Scor
	Niciodată	Aproape Niciodată	Uneori	Adesea	Aproape întotdeauna	Întotdeauna	
40. preferă să bea în loc să mănânce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
41. preferă mâncarea crocantă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
42. mănâncă mai bine când este distrat sau amuzat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
43. durează mai mult de 30 de minute să mănânce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44. are nevoie de o atmosfera calmă, liniștită la momentul mesei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
45. vrea aceeași mâncare pentru mai mult de 2 săptămâni la rând	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Itemii de mai jos sunt punctați astfel	5	4	3	2	1	0	
	Niciodată	Aproape Niciodată	Uneori	Adesea	Aproape întotdeauna	Întotdeauna	
46. îi place să mănânce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
47. mănâncă o varietate de alimente (fructe, legume, alimente ce conțin proteine etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48. este dispus să stea așezat la masă pentru a mânca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
49. deschide gura când îi este oferită mâncarea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
50. este dispus să atingă mâncarea cu mâinile lui/ei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scorul Subscalei Comportamente problematice în timpul mesei							
<p>Dacă doriți să explicați vreunul dintre răspunsuri, va rugăm să o faceți aici:</p>							

Itemii de mai jos sunt punctați astfel							
	0	1	2	3	4	5	
Pentru itemii de mai jos, dacă vârsta copilului dumneavoastră este mai mică de 15 luni și nu i se oferă alimente ce trebuie mestecate bifați Niciodată. Dacă vârsta copilului dumneavoastră este mai mare de 15 luni și nu i se oferă aceste mâncăruri sau refuză să le mănânce, selectați Întotdeauna	Niciodată	Aproape Niciodată	Uneori	Adesea	Aproape întotdeauna	Întotdeauna	Scor
75. trebuie să i se amintească să mestece mâncarea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
76. sugerează mâncarea pentru a o înmuia, mai degrabă decât să o mestece	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
77. mestecă mâncarea dar nu o înghite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
78. mestecă o bucată de mâncare un timp îndelungat (~30 secunde sau mai mult)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scorul Subscalei Procesarea Orală							
<p>Dacă doriți să explicați vreunul dintre răspunsuri, va rugăm să o faceți aici:</p>							

INSTRUMENTUL DE EVALUARE PENTRU ALIMENTAȚIE PEDIATRICĂ (PediEAT)

INSTRUCȚIUNI DE SCORARE

1. Punctajele atribuite itemilor PediEAT sunt interpretate astfel: scorurile scăzute indică mai puține simptome în timp ce scorurile crescute indică mai multe simptome de alimentare problematică. Există numere deasupra itemilor, indicând punctajul pe care fiecare răspuns l-ar primi. Rețineți că punctajele se pot schimba în cadrul subscalelor. De exemplu, subscala Simptome Fiziologice este scorată cu Niciodată=0 și Întotdeauna=5, în timp ce subscala Alimentare Selectivă/Restrictivă este scorată cu Niciodată=5 și Întotdeauna= 0. De asemenea, rețineți că în cadrul subscalei Comportamente problematice în timpul mesei și în cadrul subscalei Alimentare Selectivă/Restrictivă există un subset de itemi la final care sunt scorati diferit de ceilalți itemi din aceeași subscală. Puteți folosi coloana din dreapta a chestionarului PediEAT pentru a înregistra punctajul pentru fiecare item.
2. Există unii itemi care pot să nu se aplice din cauza vârstei copilului evaluat. De exemplu, există instrucțiuni specifice pentru părinți, deasupra itemilor care se referă la masticăție. Dacă un copil este mai mic de 15 luni și nu i se oferă alimente ce trebuie mestecate, ei trebuie să o puncteze ca nefiind problematică. Dacă un copil este mai mare de 15 luni și nu i se oferă încă alimente ce necesită mestecare sau refuză să mănânce acest tip de mâncare, părintele trebuie să răspundă într-o manieră care să indice starea ca problematică.
3. Adunați punctajul obținut de la fiecare item, din fiecare zonă. Există o căsuță la final care va înregistra scorul total pentru acea zonă (scorul subscalei). Transferați scorul total al fiecărei zone în tabelul de mai jos.
4. Folosiți valorile de referință pentru fiecare categorie de vârstă din paginile următoare pentru a determina nivelul de îngrijorare asociat cu punctajul obținut de copil. Vă rugăm să folosiți vârsta corectată în cazul în care copilul este mai mic de 2 ani și a fost născut prematur, la mai puțin de 37 de săptămâni (ex. copilul s-a născut cu mai mult de 3 săptămâni înainte de termen)

	Scor	Nivel de îngrijorare (încercuțiți)		
Simptome fiziologice		Deloc îngrijorător	Îngrijorător	Foarte îngrijorător
Comportamente problematice în timpul mesei		Deloc îngrijorător	Îngrijorător	Foarte îngrijorător
Alimentare selectivă/restrictivă		Deloc îngrijorător	Îngrijorător	Foarte îngrijorător
Procesare Orală		Deloc îngrijorător	Îngrijorător	Foarte îngrijorător
Scor total		Deloc îngrijorător	Îngrijorător	Foarte îngrijorător

NOTIȚE

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru sugari cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 luni

Următoarele valori de referință sunt pentru sugari între 6 luni și 0 zile și 9 luni și 0 zile. În cazul copiilor născuți prematur, la mai puțin de 37 de săptămâni, vă rugăm să folosiți vârsta corectată a copilului pentru a determina ce valori de referință să înregistrați.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 27	27 - 31	32 - 135
Comportamente problematice în timpul mesei	< 30	30 - 36	37 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 26	26 - 27	28 - 75
Procesare Orală	< 37	37 - 42	43 - 65
Scor total	< 101	101 - 116	117 - 390

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru sugari cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 luni

Următoarele valori de referință sunt pentru sugari între 9 luni și 1 zi și 12 luni și 0 zile. În cazul copiilor născuți prematur, la mai puțin de 37 de săptămâni, vă rugăm să folosiți vârsta corectată a copilului pentru a determina ce valori de referință să înregistrați.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 24	24 - 31	32 - 135
Comportamente problematice în timpul mesei	< 32	32 - 38	39 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 27	27 - 31	32 - 75
Procesare Orală	< 32	32 - 37	38 - 65
Scor total	< 102	102 - 124	125 - 390

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 luni

Următoarele valori de referință sunt pentru copii între 12 luni și 1 zi și 15 luni și 0 zile. În cazul copiilor născuți prematur, la mai puțin de 37 de săptămâni, vă rugăm să folosiți vârsta corectată a copilului pentru a determina ce valori de referință să înregistrați.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 29	29 - 34	35 - 135
Comportamente problematice în timpul mesei	< 38	38 - 46	47 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 28	28 - 31	32 - 75
Procesare Orală	< 31	31 - 35	36 - 65
Scor total	< 107	107 - 125	126 - 390

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru copii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 luni

Următoarele valori de referință sunt pentru copii între 15 luni și 1 zi și 18 luni și 0 zile. În cazul copiilor născuți prematur, la mai puțin de 37 de săptămâni, vă rugăm să folosiți vârsta corectată a copilului pentru a determina ce valori de referință să înregistrați.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 17	17 - 20	21 - 135
Comportamente problematice în timpul mesei	< 38	38 - 44	45 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 26	26 - 28	29 - 75
Procesare Orală	< 29	29 - 32	33 - 65
Scor total	< 98	98 - 110	111 - 390

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru copii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 luni

Următoarele valori de referință sunt pentru copii între 18 luni și 1 zi și 24 luni și 0 zile. În cazul copiilor născuți prematur, la mai puțin de 37 de săptămâni, vă rugăm să folosiți vârsta corectată a copilului pentru a determina ce valori de referință să înregistrați.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 16	16 - 22	23 - 135
Comportamente problematice în timpul mesei	< 43	43 - 48	49 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 22	22 - 27	28 - 75
Procesare Orală	< 24	24 - 30	31 - 65
Scor total	< 97	97 - 107	108 - 390

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru copii în vârstă cu vârsta cuprinsă între 2 și 2.5 ani

Următoarele valori de referință sunt pentru copii între 2 ani și 1 zi și 2.5 ani și 0 zile. În cazul copiilor născuți prematur, la mai puțin de 37 de săptămâni, vă rugăm să folosiți vârsta corectată a copilului pentru a determina ce valori de referință să înregistrați.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 18	18 - 21	22 - 135
Comportamente problematice în timpul mesei	< 47	47 - 48	49 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 23	23 - 28	29 - 75
Procesare Orală	< 27	27 - 33	34 - 65
Scor total	< 106	106 - 120	121 - 390

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2.5 și 3 ani

Următoarele valori de referință sunt pentru copii între 2.5 ani și 1 zi și 3 ani și 0 zile.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 15	15 - 22	23 - 135
Comportamente problematice în timpul mesei	< 54	54 - 60	61 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 21	21 - 25	26 - 75
Procesare Orală	< 26	26 - 29	30 - 65
Scor total	< 109	109 - 119	120 - 390

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 4 ani

Următoarele valori de referință sunt pentru copii între 3 ani și 1 zi și 4 ani și 0 zile.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 16	16 - 19	20 - 135
Comportamente problematice în timpul mesei	< 51	51 - 55	56 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 20	20 - 22	23 - 75
Procesare Orală	< 27	27 - 29	30 - 65
Scor total	< 106	106 - 112	113 - 390

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 5 ani

Următoarele valori de referință sunt pentru copii între 4 ani și 1 zi și 5 ani și 0 zile.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 16	16 - 19	20 - 135
Comportamente problematice în timpul mesei	< 51	51 - 57	58 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 19	19 - 21	22 - 75
Procesare Orală	< 24	26 - 27	28 - 65
Scor total	< 102	102 - 114	115 - 390

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 6 ani

Următoarele valori de referință sunt pentru copii între 5 ani și 1 zi și 6 ani și 0 zile.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 14	14 - 19	20 - 135
Comportamente problematice în timpul mesei	< 51	51 - 54	55 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 16	16 - 22	23 - 75
Procesare Orală	< 22	22 - 26	27 - 65
Scor total	< 96	96 - 109	110 - 390

Instrumentul de evaluare pentru alimentație pediatrică (PediEAT)

Valori de referință pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 7 ani

Următoarele valori de referință sunt pentru copii între 6 ani și 1 zi și 7 ani și 0 zile.

	< 90 % Deloc îngrijorător	90 - 95 % Îngrijorător	> 95 % Foarte îngrijorător
Simptome fiziologice	< 14	14 - 18	19 - 135
Comportamente problematice din timpul mesei	< 42	42 - 47	48 - 115
Alimentare selectivă/restrictivă	< 19	19 - 20	21 - 75
Procesare Orală	< 23	23 - 27	28 - 65
Scor total	< 82	82 - 99	100 - 390